

XII COLEOPTERA, VI : UNE NOUVELLE ESPÈCE DE MALACODERMES DES INDES.

Par MAURICE PIC.

Idgia arbori, n. sp.

Angustatus, nitidus, griseo pubescens et pilis nigris hirsutus, nigro-plumbeo micans, pygidio testaceo. Antennis ad basin rufo notatis, pedibus nigris. Capite elongato; antennis gracilibus; thorace elongato, pro parte ruguloso-punctato, in medio aliquot subcaniculato; elytris elongatis et angustatis, subparallelis, punctato-rugulosis et lineato tuberculatis.

Étroit, brillant, orné d'une pubescence grise et hérissé de poils noirs redressés, d'un noir plombé brillant, parfois à reflets faiblement verdâtres ou bleuâtres, avec le pygidium testacé. Palpes un peu teintés de roux et antennes foncées, ces dernières tachées de roux en dessous des premiers articles, pattes foncées. Tête allongée, creusée entre les yeux; antennes grêles, pas très longues, presque entièrement foncées; prothorax étroit, plus long que large, rétréci aux deux extrémités, orné d'une ponctuation en partie ruguleuse, avec d'ordinaire une trace de sillon médian non complet; élytres bien plus larges que le prothorax, longs et étroits, plus étroits encore chez ♂ que chez ♀, subparallèles, arrondis séparément à l'extrémité, ornés d'une ponctuation ruguleuse et ayant des rangées de petits tubercules ou de granules brillantes plus ou moins marqués. Dessous du corps foncé comme le dessus, à l'exception de l'extrémité abdominale qui est testacée; pattes grêles, foncées, hanches parfois un peu roussâtres. Long. 8-9 mill.

Yembung, 1100 pieds et Rotung, 1400 pieds.

Les types et co-types de cette espèce, au nombre de cinq, font partie des collections de l'Indian Museum de Calcutta et de la collection Pic.

Peut se placer près de *I. foveifrons*, Fairm; bien distinct par sa coloration, le prothorax plus étroit et foncé au lieu d'être testacé.